

Пардифен А К Т И В

Быстрое освобождение от отёков, растяжений,
боли в пояснице, суставах и мышцах.



Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства

Торговое название: Пардифен Актив Гель.

Международное непатентованное название:
Диклофенак + Льянное масло + Метил салицилат +
Ментол.

Лекарственная форма: гель для наружного
применения.

Состав: каждый грамм содержит:

Диклофенак диэтиламин ВР эквивалентно	
Диклофенаку натрия	3 % w/w;
Льянное масло	3 % w/w;
Метил салицилат ВР	10 % w/w;
Ментол ВР	5 % w/w.

Фармакотерапевтическая группа: Нестероидное
противовоспалительное средство для наружного
применения.

Код АТХ: М02АА15.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика:

Пардифен Актив гель оказывает противовоспалительное действие, т.е. действует на разные звенья воспалительного процесса: антипростагландиновый эффект; снижение повышенной проницаемости, нормализация процессов микроциркуляции, уменьшение влияния гистамина, брадикинина и др. медиаторов воспаления. Анальгезирующие свойства обусловлены способностью ослаблять влияние брадикинина, также способствует местному жаропонижающему действию.

При местном применении вызывает ослабление или исчезновение боли в месте нанесения геля, в том числе боли в суставах в покое и при движении, уменьшает утреннюю скованность и припухлость суставов. Способствует увеличению объема движений.

Фармакокинетика:

При местном применении частично всасывается через кожу, биодоступность - 6%. Связь с белками плазмы - 99,7%. Выводится почками. Гель быстро всасывается и проникает в подлежащие ткани: в подкожную клетчатку, мышечную ткань, суставную капсулу и полость сустава. У больных полиартритом, которые получают местную терапию (в области воспаленного сустава), концентрация в синовиальной жидкости выше, чем концентрация в плазме.

Показания к применению:

- воспалительные и дегенеративные заболевания суставов;
- ревматизм мягких тканей;
- травматические ушибы, растяжения связок, мышц и сухожилий;
- воспалительные отеки мягких тканей, болезненность мышц и суставов, вызванные тяжелыми физическими нагрузками.

Противопоказания:

- Повышенная чувствительность к диклофенаку и другим компонентам препарата;
- повышенная чувствительность к ацетилсалициловой кислоте или другим НПВС (в т.ч. "аспириновая триада");
- язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки в фазе обострения;
- беременность и период грудного вскармливания;
- детский возраст до 6 лет.

С осторожностью: следует избегать попадания препарата Пардифен Актив Гель, на поврежденную поверхность кожи, открытые раны, глаза и слизистые оболочки.

Не следует использовать Пардифен Актив Гель, детям до 6 лет без консультации врача.

Способ применения и дозы:

Только для наружного применения!

Гель 2-4 г (полоска геля 4-8 см при полностью открытой горловине тубы) наносят тонким слоем на кожу над очагом воспаления и слегка втирают 2-3 раза в сутки. Максимальная суточная доза геля не должна превышать 8 г. Продолжительность курса лечения не должна превышать 14 дней без консультации врача.

Побочные действия:

Возникающие побочные эффекты зависят от индивидуальной чувствительности, величины применяемой дозы и продолжительности лечения.

Местные реакции: экзема, фотосенсибилизация, контактный дерматит (зуд, гиперемия, отечность обрабатываемого участка кожи, папулы, везикулы, шелушение).

Системные реакции: генерализованная кожная сыпь, аллергические реакции (крапивница, ангионевротический отек, бронхоспастические реакции).

Передозировка:

Симптомы: ввиду низкой системной абсорбции при аппликации геля, передозировка маловероятна. При случайном приеме внутрь возможно развитие системных побочных реакций.

Лечение: промывание желудка, индукция рвоты, активированный уголь, форсированный диурез, симптоматическая терапия. Диализ не эффективен ввиду высокой степени связывания с белками диклофенака.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Следует проконсультироваться с врачом перед применением геля, если Вы находитесь под наблюдением врача или применяете другие НПВС.

Форма выпуска:

Гель для наружного применения 30 г в алюминиевой тубе вместе с инструкцией по применению в картонной упаковке.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С и в местах, недоступных для детей. Не замораживать!

Срок годности:

Указано на упаковке. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска:

Без рецепта.